

NOTA TÉCNICA 6

AFASTAMENTOS DO TRABALHO

As estatísticas do número de afastamento em razão de diarreias ou vômitos foram estimadas com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 do IBGE. A pesquisa de saúde perguntou a uma amostra representativa da população brasileira se houve afastamentos das atividades rotineira nas duas semanas anteriores à data da entrevista, qual o motivo dos afastamentos e por quantos dias os entrevistados estiveram afastados.

Em 2013, 576.213 brasileiros indicaram ter se afastado de suas atividades nas duas semanas anteriores ao dia em que a entrevista foi realizada em razão da ocorrência de diarreias ou vômitos. Com base nesses dados, estima-se que houve um total 14,982 milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito no país ao longo do ano de 2013.

Esses relatos de afastamento indicam uma taxa de incidência de 74,7 casos por mil habitantes ao longo do ano de 2013 no Brasil. Essas taxas de incidência foram mais altas nas regiões Norte e Nordeste. No Nordeste, a taxa de incidência alcançou 88,0 casos a cada mil habitantes e, no Norte, 82,5 casos por mil pessoas. Com exceção da região Centro-Oeste, a incidência de afastamentos é regularmente maior nas capitais.

Os dados estão disponíveis apenas para o Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, capitais e as 21 regiões metropolitanas analisadas no Painel Saneamento Brasil.